

## Cerdos

### Recomendaciones importantes:

Todas las dosificaciones de los productos son orientativas y destinadas a animales genéticamente seleccionados por poca deposición de grasa.

Estas cantidades deben modificarse de acuerdo con las características genéticas, instalaciones, temperatura, ambiente, etc.



### DATOS ANALÍTICOS (en %)

ALIMENTO	Proteínas Mín.	Grasas Mín.	Fibra Máx. (No + de)	Calcio (Promedio)	Fósforo (Promedio)	Energía digestible
Lechones	20	3	4,5	1	0,8	3250 KCal/Kg.
Cerdo Desarrollo	16	3	4	0,9	0,8	3200 KCal/Kg.
Cerdo Terminación	14	3	6	0,8	0,7	3200 Kcal/Kg.
Cerdas Madres	15	3	6	0,8	0,7	3100 Kcal/Kg.
Concentrado Cerdo	35	3	11	4	2	2800 Kcal/Kg.

"Todo lo que se haga en defensa del suelo y el ambiente tiene diseño de grandeza"



ESPECIALISTAS EN NUTRICIÓN ANIMAL

Saavedra 1429 - Tel.: 54-291-4552288 (Líneas Rotativas)  
B8001AHC Bahía Blanca - Buenos Aires - Argentina  
E-mail: ventas@aliba.com.ar - [www.aliba.com.ar](http://www.aliba.com.ar)

PROYECCION



### Línea de Alimentos Balanceados para

# Cerdos

### Lechones (Iniciación) ALIBA

#### Características:

Es un alimento de valor energético rico en proteínas digeribles, potenciado con vitaminas y minerales a niveles de seguridad. Contiene un antibiótico y un antidiarreico.

#### Administración:

Se administra a discreción desde los primeros días de vida hasta los 20 kilos de peso vivo. Es necesario utilizar comederos a los que las madres no tengan acceso.

Se estima un consumo acumulado de 25 kilos de alimento hasta los 20 kilos de peso corporal.

#### Precaución:

Destete: No debe realizarse antes de que los animales consuman 500 - 700 gramos de alimento durante 3 - 4 días en forma regular.

#### Recomendaciones:

- Es conveniente alimentar muy bien a los lechones hasta las 8 a 10 semanas de edad, pues cuanto antes lleguen a los 20 kilos de peso, mayor será la eficiencia total al final del engorde.
- Los comederos deben situarse junto a los bebederos y cerca del lugar donde está la madre.
- Nunca castrar junto o cerca del destete, de alguna vacunación o cambio de alimento. La edad más propicia es dentro de las primeras 4 semanas.
- Seguir un estricto programa de lucha contra las lombrices y piojos. Aplicar buenos antiparasitarios después del destete y luego cada vez que sea necesario.

● Muchas enfermedades del recién nacido pueden penetrar a través del ombligo, por lo tanto conviene ligar y desinfectar el cordón umbilical en el momento del nacimiento.

● El destete de los lechones puede hacerse a diferentes edades, pero se estima que para el tipo de explotación mixta puede hacerse sin ningún tipo de inconvenientes entre las 6 y 8 semanas de edad, con un peso de 16 - 17 kilos. Destetes más precoces, requieren instalaciones y condiciones especiales.

#### Presentación:

Comprimido - A granel o en bolsas.

